

Чесотка (scabies) - заразное паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом *Sarcoptes scabiei* (L.).

Признаки: зуд, усиливающийся в вечернее и ночное время, папулезно-везикулярными высыпаниями.

Возбудитель чесотки - чесоточный клещ - *Sarcoptes scabiei*.

Очаг - группа людей, в которой имеется больной - источник заражения и условия для передачи возбудителя.

Критерии диагностики:

- зуд, усиливающийся в вечернее и ночное время;
- наличие типичных чесоточных ходов и их реактивных вариантов;
- цепочка везикул, пузырь, лентикулярная папула, "ракетка" и т.п., изолированных везикул, фолликулярных, лентикулярных папул;
- типичная локализация высыпаний: чесоточные ходы на кистях, запястьях, стопах, локтях; фолликулярные папулы - на передне-боковой поверхности тела; везикулы - на кистях и стопах в непосредственной близости от ходов; лентикулярные папулы на половых органах мужчин, ягодицах, аксилярной и пупочной областях, молочных железах у женщин;
- наличие характерных для чесотки симптомов: Арди, Горчакова, Михаэлиса, Сезари;
- преобладание при осложненной чесотке стафилококкового импетigo на кистях, запястьях, стопах; эктим - на голенях и ягодицах; остиофолликулитов и фурункулов на туловище и ягодицах;
- отсутствие эффекта от проведенного ранее лечения антигистаминными, десенсибилизирующими, противовоспалительными средствами, в том числе кортикоステроидными мазями.

Профилактика:

- активное выявление больных (профилактические осмотры)
- установление очагов чесотки и их ликвидация
- выявление источника заражения, контактных лиц и взаимоотношения с ними

Профилактическое лечение проводится однократно.

Профилактическое лечение всех контактных лиц проводится в том случае, если в процессе наблюдения выявляются новые больные в очаге.

Текущая дезинфекция направлена на уничтожение возбудителя на постельных принадлежностях, одежде и предметах личной гигиены больного, но не в помещении.

АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Общие правила:

- применять препарат в вечернее время, лучше перед сном, что связано с суточным ритмом жизни возбудителя заболевания чесоточного клеща;
- мытье больного и смена нательного и постельного белья проводится перед началом лечения и после его окончания;
- нанесение препарата проводят во все участки кожного покрова, за исключением области лица и волосистой части головы; у детей до трех лет нанесение препарата проводится на все участки кожного покрова;
- нанесение препарата проводят только рукой (не тампоном, салфеткой), что обусловлено высокой численностью чесоточных ходов на кистях;
- избегать попадания препарата на слизистую глаз, носовых ходов и ротовой полости, а также слизистую половых органов; в случае попадания на слизистые промыть их проточной водой;
- экспозиция нанесенного на кожу препарата должна быть не менее 12 часов;
- лечение больных, выявленных в одном очаге (например, в семье), проводится одновременно во избежание реинвазии.

Используют один из противочесоточных препаратов с доказанной клинической эффективностью: бензилбензоат, медифокс, спрегаль, серная мазь (применять, строго следуя указаниям, изложенным в инструкции по применению данного средства).

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ)

Текущую и заключительную дезинсекцию проводят механическим, физическим и химическим методами.

Механический метод: изъять из обращения вещей и предметов на 3 - 10 дней, поместив в плотно закрытые полипропиленовые пакеты.

Физический метод состоит в проглаживании вещей горячим утюгом, кипячении, стирке при высоких температурах, длительном промораживании и аналогичных процедурах.

Химический метод: применить акарицидные (инсектоакарицидные) средства.

Обработку проводят в очагах чесотки (включая бытовые), а также в местах осмотра и перевозки больных чесоткой (изоляторы, санпропускники, санитарный и иной транспорт после доставки больного и т.п.). Обрабатывают все предметы, с которыми мог контактировать пациент: пол, стулья, кушетки и пр.

Пол и другие поверхности орошают из распыливающих аппаратов (эмulsionей или, супензией инсектицида) или из аэрозольных баллонов, или протирают ветошью или плюшевыми щетками, смоченными водной эмульсией (супензией) инсектицида.

Для обработки текстильных и других изделий, которые могли быть заражены чесоточными клещами, используют инсектоакарицид, либо замачивая зараженные вещи, либо ороняя их из распыливающей аппаратуры или аэрозольной упаковки.

Нательное, постельное белье и другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водной эмульсии инсектицида на срок, указанный в инструкции на средство.

После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 5 л воды), после чего стирают обычным способом.

Не подлежащую стирке верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают водной эмульсией (супензией) или распыляют средство из опрыскивателя, нанося инсектицид на всю площадь обрабатываемых вещей.

Одеяла, подушки, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание следует уделить швам и складкам на внутренней стороне одежды. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания в течение дня.

Обработку конкретным средством проводят, строго следуя указаниям, изложенным в этикетке и инструкции по применению данного средства, согласно его сфере применения.

Меры предосторожности: в соответствии с инструкцией прилагаемой к препаратам.

При симптомах отравления необходимо обратиться за врачебной помощью.

Срок годности на изделия, входящие в упаковку, указан на упаковке каждого изделия. По истечению срока годности, изделия подлежат замене на новые.

Содержимое укладки, предназначенной для проведения противочесоточных мероприятий
УКЛАДКА ПРОТИВОЧЕСОТОЧНАЯ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Клеенчатый мешок для сбора вещей больного	шт	1
Пакет п/э с ЗИП-застежкой для вещей больного	шт	2
Бутыль стеклянная с завинчивающейся крышкой, с мерной шкалой для разведения дез. растворов 1000 мл	шт	1
Ведро пластиковое с мерной шкалой 5 л для разведения растворов	шт	1
Мерный стакан 250 мл п/э	шт	1
Палочка стеклянная для размешивания растворов 220 мм	шт	1
Перчатки мед.	пара	2
Халат	шт	1
Шапочка одноразовая	шт	2
Вата 50гр	упак	1
Ножницы 110 мм	шт	1
Аэрозольный опрыскиватель (ручной) ПЭТ	шт	1
Лупа	шт	1
Фонарик диагностический	шт	1
Мыло хозяйственное	шт	1
Респиратор ИСТОК	шт	1
Препарат для медикаментозной наружной обработки пациента		
БЕНЗИЛБЕНЗОАТ мазь 20% противочесоточное средство 30 г	шт	1
Препарат для дезакаризационной обработки белья, дезинфекционной обработки помещения		
ЦИФОКС 500 мл	шт	1
Сода кальцинированная 600 гр	шт	1
Салфетки универсальные в рулоне	шт	1
Тряпка для пола	шт	2
Контейнер-укладка	шт	1

ИНСТРУКЦИЯ

разработана в соответствии с ПРИКАЗОМ от 24 апреля 2003 г. N 162
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА
 "ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. ЧЕСОТКА"